

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

ou étiquette

Coordonnées médecin demandeur :
.....
Adresse :
.....
N° de téléphone :
Email :

DEMANDE D'EXAMEN PET-CT

¹⁸F-FDG PSMA ⁶⁸Ga-Dotatate ¹⁸F-Choline Autre, précisez

Rendez-vous fixé le :

Merci de convoquer directement le patient entre le et le

CT/IRM récents effectués **hors CINOV** : oui non

Si oui, merci de nous faire parvenir les rapports et les images via le PACS-CINOV ou par CD

INFORMATIONS CLINIQUES

Poids : kg Taille : cm

Allergies connues	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	Corticothérapie	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui
Claustrophobie	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	Mobilité réduite	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui
Diabète insulino-requérant	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	Chaise roulante	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui

INDICATIONS CLINIQUES ET QUESTIONS POSÉES

Images de l'examen à envoyer sur le PACS CHUV EHNV HIRSLANDEN

Copie du rapport à :

Date de la demande :

Signature du demandeur :

Document à retourner par email à info@cinov.ch ou par fax : 024 424 80 88

Tél secrétariat 024 424 80 80 - de 08h00 à 18h00

Le patient va recevoir par courrier postal un document d'information détaillé concernant le déroulement de l'examen PET-CT et une convocation avec la date définitive de l'examen de la part du secrétariat du CINOV.

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L'EXAMEN PET-CT

Le patient doit être à jeun 6h avant l'examen. Il peut prendre son traitement habituel avec un verre d'eau plate.

Cas particulier pour le patient diabétique : la glycémie à jeun doit être inférieure à 11 mmol/l avant l'examen.

⇒ **De type I ou insulino-requérant :**

- Attribution du 1^{er} rendez-vous de la journée : faire le traitement d'insuline normalement le soir précédent l'examen. Il doit rester à jeun le jour même et il doit prendre tout le matériel nécessaire pour l'insuline du matin lors du rendez-vous PET-CT.
- Attribution du dernier rendez-vous de la journée : le patient prend son insuline et un petit-déjeuner léger 6 heures avant l'examen.

⇒ **De type II :**

Le patient prend son traitement comme d'habitude et reste à jeun 6 heures avant le rendez-vous.

Indications prises en charge par l'OPAS

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/fr

Directives cliniques de la SSMN

https://nuklearmedizin.ch/wp-content/uploads/2021/06/2021_02_09_SGNM_Klinische_Richtlinien_F.pdf